SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lerasept® VET 250

Silny środek dezynfekujący do stosowania w hodowli zwierząt

Używaj substancji biobójczych w bezpieczny sposób. Przed użyciem produktu przeczytaj etykietę i instrukcję.

Opis produktu:

Lerasept® VET 250 jest płynnym koncentratem przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze) (PT2, PT4).

Lerasept® VET 250 może być stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze, w tym wobec wirusa ptasiej grypy H5N1 oraz wirusa pryszczycy) na powierzchniach porowatych i nieporowatych w miejscach, gdzie przebywają i są transportowane zwierzęta (PT3). Stosowanie metodą zanurzeniową (wykazuje działanie wirusobójcze, w tym wobec wirusa ASF) (PT3).

Produkt można stosować również przy użyciu zamgławiania ULV (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze, sporobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze) w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłu spożywczego i obszarze weterynaryjnym (PT2, PT3, PT4).

Preparat można stosować do konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych lub przetwórczych (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze) (PT11).

Podczas korzystania z tych produktów, wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych muszą być przestrzegane. Aby uzyskać informacje dotyczące przechowywania, specyfikacji niebezpieczeństw i przepisów bezpieczeństwa, należy zapoznać się z obowiązującymi kartami charakterystyk. Rozwiązania aplikacyjne i pozostałości produktu muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze doświadczenie. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje te są niezobowiązujące, służą jako porady. Dlatego też nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym roszczeń osób trzecich.

Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka Sp. K.
Ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań Tel.: +48 61 666 11 6 Faks: +48 61 666 11 63

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

.

Lerasept® VET 250 zapewnia:

- Dezynfekcje o szerokim spektrum
- Wysoką i szybką penetracja powierzchni
- Bez formaldehydu

Dane techniczne:	Postać:	płyn
	Barwa:	odpowiada produktowi
	Gęstość:	ok. 1.06 g/cm^3
	Wartość pH:	3,7 -5
	Punkt zamarzania:	0°C

Ważne składniki:

glutaral; alkil(C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-C16)); Chlorek didecylodimetyloamoniowy

Substancje czynne: 1,5-pentanedial (Aldehyd glutarowy) (CAS: 111-30-8), zaw.: 25 g/100g; Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) (CAS: 7173-51-5), zaw.: 6,5 g/100g; Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS: 68424-85-1), zaw.: 12,5 g/100g

Zastosowanie:

Po dokładnym wstępnym oczyszczeniu i osuszeniu powierzchni **Lerasept® VET 250,** można aplikować za pomocą urządzeń pianotwórczych lub natryskowych. Dezynfekowanej powierzchni nie należy spłukiwać przed upływem zalecanego czasu kontaktu.

Dezynfekcja powierzchni z kontaktem i bez kontaktu z żywnością (PT2 i PT4): stosować roztwór o stężeniu 0,1% dla działania bakteriobójczego lub 0,2% dla działania grzybobójczego i drożdżakobójczego. Czas ekspozycji: 20 minut. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością należy po dezynfekcji spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Podczas korzystania z tych produktów, wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych muszą być przestrzegane. Aby uzyskać informacje dotyczące przechowywania, specyfikacji niebezpieczeństw i przepisów bezpieczeństwa, należy zapoznać się z obowiązującymi kartami charakterystyk. Rozwiązania aplikacyjne i pozostałości produktu muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze doświadczenie. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje te są niezobowiązujące, służą jako porady. Dlatego też nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym roszczeń osób trzecich.

Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka Sp. K.
Ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań Tel.: +48 61 666 11 6 Faks: +48 61 666 11 63

Zastosowanie weterynaryjne (PT3):
na powierzchniach porowatych stosować roztwór o stężeniu 2,5% dla działania bakteriobójczego; 2% dla działania grzybobójczego i drożdżakobójczego; 0,2% dla działania wirusobójczego, w tym wobec wirusa ptasiej grypy H5N1; 1% dla działania bójczego wobec wirusa pryszczycy. Na powierzchniach nieporowatych: roztwór o stężeniu 0,2% dla działania bakteriobójczego i wirusobójczego (skuteczny wobec wirusa ptasiej grypy H5N1), w stężeniu 1% dla działania wirusobójczego wobec wirusa pryszczycy, w stężeniu 2% dla działania grzybobójczego i drożdżakobójczego. Przy użyciu metody zanurzeniowej w stężeniu 0,2% dla działania wirusobójczego, w tym wobec wirusa ASF. Czas ekspozycji: 30 minut w temperaturze 10°C. Po dezynfekcji pomieszczenia muszą być wentylowane przez minimum 1 godzinę przed powrotem zwierząt.

Zastosowanie metodą zamgławiania ULV (PT2, PT3 i PT4): stosować roztwór o stężeniu 5% przez przynajmniej 30 minut od momentu całkowitego wypełnienia pomieszczenia mgłą, co osiąga się poprzez rozprowadzenie 31 ml roztworu roboczego na każdy 1 m³ kubatury.
Działanie: bakteriobójcze, sporobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze. Temperatura w pomieszczeniu, w którym odbywa się zamgławianie powinna wynosić 20°C. Operator powinien dostosować czas zamgławiania do kubatury pomieszczenia i wydajności urządzenia, tak aby rozprowadzić wymaganą ilość roztworu. Podczas procesu zamgławiania okna i drzwi muszą pozostać szczelnie zamknięte, a wentylacja wyłączona. Podczas dezynfekcji pomieszczenia nie mogą w nim przebywać ludzie oraz zwierzęta. Przed rozpoczęciem procesu dezynfekcji należy usunąć lub zabezpieczyć żywność, paszę oraz wodę pitną, aby nie miały kontaktu z produktem.

Po zastosowaniu produktu powierzchnie użytkowe należy spłukać zimną wodą zdatną do picia. Po zastosowaniu produktu metodą zamgławiania pomieszczenia należy wentylować przed użytkowaniem przez co najmniej 2 godziny.

Konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych lub przetwórczych (PT11): stosować roztwór o stężeniu 0,02% przez 3 godziny w temperaturze 10°C dla działania bakteriobójczego, grzybobójczego i drożdżakobójczego.

Podczas korzystania z tych produktów, wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych muszą być przestrzegane. Aby uzyskać informacje dotyczące przechowywania, specyfikacji niebezpieczeństw i przepisów bezpieczeństwa, należy zapoznać się z obowiązującymi kartami charakterystyk. Rozwiązania aplikacyjne i pozostałości produktu muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze doświadczenie. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje te są niezobowiązujące, służą jako porady. Dlatego też nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym roszczeń osób trzecich.

Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka Sp. K.
Ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań Tel.: +48 61 666 11 6 Faks: +48 61 666 11 63

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zgodność materiałowa: Preparat może być stosowany na wszystkie metalowe i plastikowe powierzchnie powszechnie stosowane w rolnictwie. Pomocne może być zastosowanie testowe na odpowiedniej części powierzchni.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Istotne zwroty określające zagrożenie i środki ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

W razie ewentualnego pobrania zbyt dużej ilości koncentratu z oryginalnego pojemnika, nie wolno go w żadnym wypadku odlewać z powrotem.

Wpływ na środowisko: W przypadku zastosowania zgodnego z instrukcją użycia i przy zachowaniu obowiązujących przepisów nie ma zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Magazynowanie: Preparat przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach; w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem, źródłem zapłonu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Tylko do profesjonalnego zastosowania.

Podczas korzystania z tych produktów, wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych muszą być przestrzegane. Aby uzyskać informacje dotyczące przechowywania, specyfikacji niebezpieczeństw i przepisów bezpieczeństwa, należy zapoznać się z obowiązującymi kartami charakterystyk. Rozwiązania aplikacyjne i pozostałości produktu muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze doświadczenie. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje te są niezobowiązujące, służą jako porady. Dlatego też nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym roszczeń osób trzecich.

Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka Sp. K.
Ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań Tel.: +48 61 666 11 6 Faks: +48 61 666 11 63